Pratique en routine de l'OGM dans le Myélome Multiple

BIONANO USER GROUP MEETING, Paris, 13/11/2024

C. Menten (PhD) et N. Catarin (MD)

Le Myélome Multiple : analyse de routine en cytogénétique

1. Prise en charge des MM en cytogénétique
2. Mise en place de l'OGM et intérêt dans le MM
3. Validation biologique avec le choix des événements rapportés :
 - a. critères
 - b. intégration dans les classifications internationales du MM
4. Présentation de cas intéressants

Prise en charge des MM en cytogénétique

- Pas de culture cellulaire -> pas de caryotype standard

⇒ Sélection des plasmocytes pour analyse en cytogénétique « moléculaire ».

- Remboursement INAMI au diagnostic du MM (selon l'article 33 bis) :

- 3 analyses FISH

- 1 analyse sur ADN extrait : CGHarray ou Optical Genome Mapping (OGM, Bionano)

- Analyse 33bis donc 100% accréditation

!!!! Pas de remboursement pour la sélection mais juste pour les analyses.

Prise en charge des MM en cytogénétique

- Sélection avec anticorps anti-CD138 couplés à des billes magnétiques (EasySep Human CD138 positive selection kit, StemCell)
- Sélection positive

Prise en charge des MM en cytogénétique : flux avant mars 2024

- Analyses sur plasmocytes sélectionnés :
 - ➔ FISH sur cytopsin des plasmocytes sélectionnés : 30 000 cellules/
cytopsin
 - ➔ CGHarray : ADN extrait à partir des cellules sélectionnées, minimum
200 000 cellules.

Flux d'analyse en fonction du nombre de cellules récoltées (avant mars 2024) :

→ Si <300 000 cellules récoltées :

- uniquement **cytopins**

⇒ **3 FISHs** réalisées

→ Si >300 000 cellules récoltées :

- Réalisation de 2 à 4 **cytopins**

- Congélation du reste des cellules (culot) pour extraction **ADN** (CGH et Biologie moléculaire)

⇒ **CGHarray** + **3 FISH** réalisées

Choix des analyses FISHs :

3 FISHs remboursées : priorité à la détection des réarrangements IGH et délétion TP53

⇒ Intérêt de l'**OGM** dans la détection **des réarrangements IGH**
et la détection d'**hyperdiploïdie**.

Mise en place de l'OGM et intérêt dans le MM

→ OGM : Nécessite minimum 1 million de cellules

⇒ Test sur moelle totale (protocole extraction classique sur moelle totale)

% plasma cell	CNVs		Recurrent SVs	
	array-CGH	OGM	FISH	OGM
56	CNVs	detected	IGH::MAF	IGH::MAF
20	not detected	not detected	not detected	not detected
26	hyperdiploidy	partially detected	not detected	not detected
14	not detected	not detected	IGH::CCND1	not detected
21	not detected	not detected	not detected	not detected
70	hyperdiploidy	not detected	not detected	not detected
14	not detected	not detected	not detected	not detected
22	hyperdiploidy	not detected	not detected	not detected
15	CNVs	not detected	not detected	not detected
92	hyperdiploidy	not detected	not detected	not detected
10	CNVs	not detected	IGH::FGFR3	IGH::FGFR3
29	CNVs	detected	IGH::CCND1	not detected
30	CNVs and hyperdiploidy	CNVs partially detected Hyperdiploidy detected	not detected	not detected

⇒ Non
concluant

n = 13

9 CNVs /
Hyperdiploidy

- 2 cases concord completely
- 2 cases concord partially

4 SVs

- 2 cases are concordant
- 2 cases are non concordant

Mise en place de l'OGM et intérêt dans le MM

→ **OGM** : Nécessite minimum 1 million de cellules

⇒ Test sur cellules sélectionnées congelées en culot cellulaire:

- ajout de 7,5µl de DNA Stabilizer (bionano)
- centrifugation dans le cryotube étiqueté (3000g 5min),
- élimination du surnageant
- Congélation à -80°C

- Extraction via le protocole classique

Workflow Overview

Mise en place de l'OGM et intérêt dans le MM

cases	CNVs		Recurrent SVs		
	array-CGH	OGM	FISH	OGM	Recurrent SVs identified with OGM only
1	CNVs	detected	not detected		t(14;16)
2	CNVs	detected	not detected		
3	CNVs	partially detected	t(11;14)	detected	
4	CNVs	detected	t(11;14)	detected	
5	CNVs	detected	not detected		
6	CNVs	detected	t(11;14)	detected	t(8;11;14) MYC
7	CNVs	detected	not detected		t(12;14) IGH::CCND2
8	CNVs	detected	t(11;14)	detected	
9	CNVs	detected	t(11;14)	detected	
10	CNVs	detected	not detected		t(8;20;22) IGL::MYC
11	CNVs	detected	not detected		
12	CNVs	detected	not detected		
13	CNVs	detected	t(11;14)	not detected	
14	CNVs	detected	not detected		
15	CNVs	detected	not detected		
16	CNVs	detected	not detected		t(2;8) IGK::MYC
17	CNVs	detected	not detected		t(11;14)
18	CNVs	detected	not detected		
19	CNVs	detected	t(4;14)	detected	
20	CNVs	detected	t(14;16)	detected	
21	CNVs	detected	t(14;16)	detected	

n = 21 CNVs / Hyperdiploidy 95% concordance 9 SVs 95% concordance **6 additionnel recurrent SVs**

⇒ **Résultat concluant MAIS...**

Nécessité d'obtenir 1 million de cellules post tri

Mise en place de l'OGM et intérêt dans le MM

➔ OGM : Nécessite minimum 1 million de cellules

⇒ Ajout de cellules de la fraction négative pour obtenir 1 million de cellules pour OGM.

Mise en place de l'OGM et intérêt dans le MM

CNVs			
array-CGH	40%	20%	<20%
CNVs		detected	
CNVs		partially detected	
/	idem	idem	
CNVs	detected	not detected	
CNVs		detected	detected (10%)
CNVs			detected (10%)
CNVs	detected	not detected	
CNVs		detected	detected (10%)
CNVs	detected	detected	
CNVs		partially detected	
CNVs	detected		
CNVs		detected	
CNVs		detected	
CNVs		partially detected	partially detected
CNVs	detected	detected	
CNVs	partially detected (30%)	partially detected	partially detected
CNVs		partially detected	partially detected
CNVs	detected (30%)		
CNVs	detected (30%)		
CNVs	detected (30%)	detected	
CNVs		detected	
CNVs	detected		

In fractions of 40% and over:

- 90 % concordance (10/11 cases)

In fractions of 20%:

- 58,8% (10/17) perfect concordance
- 29,4% (5/17) partially concordance
- Dans 11,8% (2/17), CNVs not detected by OGM

Mise en place de l'OGM et intérêt dans le MM

Recurrent SVs			
FISH	OGM 100%	OGM 20%	OGM 10%
no recurrent SVs	t(14;16)	t(14;16)	not tested
no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs	not tested
t(11;14)	t(11;14)	t(11;14)	not tested
t(11;14)	t(11;14)	t(11;14)	not tested
no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs
no recurrent SVs	t(12;14)	not tested	t(12;14)
t(11;14)	t(11;14)	t(11;14)	t(11;14)
t(11;14)	t(11;14)	t(11;14)	t(11;14)
no recurrent SVs	t(8;20;22)(100%)	t(8;20;22)	not tested
no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs	not tested
no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs
t(11;14)	t(11;14) not detected	t(11;14) not detected	not tested
no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs	not tested
no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs	not tested
no recurrent SVs	t(2;8) (IGK::MYC)	t(2;8) (IGK::MYC)	t(2;8) (IGK::MYC)
no recurrent SVs	t(11;14)	t(11;14)	t(11;14)
no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs	not tested
no recurrent SVs	no recurrent SVs	no recurrent SVs	not tested

- All recurrent SVs detected in the "100% fraction" were detected in the "20% fraction"
- SVs are also detected in the 10% fractions (for the 5 cases tested)

Flux d'analyse en fonction du nombre de cellules récoltées (après mars 2024) :

→ Si <300 000 cellules récoltées :

- Uniquement **cytopins**

⇒ **3 FISHs** réalisées

→ Si >300 000 cellules récoltées :

- Réalisation de 2 à 4 **cytopins**

- Congélation du reste des cellules (culot)

- Ajout de cellules de la fraction négative pour obtenir 1 million de cellules pour OGM avec minimum 20% d'infiltration

- ADN disponible pour OGM **ET** biologie moléculaire

⇒ **OGM** + **1 FISH** réalisée (TP53 vs IGH::CCND1)

Mise en place de l'OGM et intérêt dans le MM

- Visualisation pangénomique des CNVs et surtout des SVs
- Gain de temps dans le délai de réponse des résultats
- Gain de temps technique

→ Limitation du nombre de cellules sélectionnées

Comparaison sélection plasmocytes

Sélection positive CD138+

- Sélection avec anticorps anti-CD138 couplés à des billes magnétiques (EasySep StemCell)
- Sélection positive

Sélection négative

- Sélection Roset Sep kit spécifique des plasmocytes (SepMate StemCell)
- Sélection négative

*Use SepMate™ to reduce centrifugation time to 10 minutes with brake on.

Comparaison sélection plasmocytes

- 15 échantillons comparés
- 3 premiers avec problème de lavage du ficoll.
- 12 utilisés pour la comparaison
- Lien entre le pourcentage d'infiltration au typage et nombre de cellules récupérées après tri.
- Quantité de cellules récoltées supérieure avec sélection sep mate qu'avec sélection easy sep.
- Pureté meilleure avec sélection easy sep que sélection sep mate.

Echantillons comparés	OGM SepMate	OGM Easy Sep	Comparaison OGM
12	8	6	identique (sauf 1 point de cassure)

Validation biologique : évènements rapportés

1. Anomalies primaires :

- Hyperdiploïdie : oui-non
- Réarrangement du gène IGH : oui-non

2. Anomalies secondaires :

- Extra-copie(s) 1q (totale ou partielle) : oui-non
- Délétion 1p (totale ou partielle) : oui-non
- Délétion TP53 : oui-non

3. Autres anomalies :

- Variations de structure :
 - t(;)(;) correspondant au réarrangement...
- Variations du nombre de copies (>5Mb) :
 - pertes :
 - pertes partielles :
 - gains :
 - gains partiels :

Validation biologique : évènements rapportés

4. Résumé :

- Facteurs cytogénétiques de pronostic standard présents :
- Facteurs cytogénétiques de mauvais pronostic présents :
- Facteurs cytogénétiques de pronostic indéterminé présents :

	Nbr total	Réarrangement IGH		
		IGH::FGFR3	IGH::CCND1	IGH::WWOX
CGH 2023	74	4	16	2
	100%	5,4	21,6	2,7
OGM 03->10/2024	47	1	13	4
	100%	2,1	27,7	8,5

Cas n°1

- Homme 75 ans
- 9% plasmocytes médullaires
- Culot 40% pour extraction ADN

Cas n°1

Cas n°2

- Femme 67 ans
- 96% plasmocytes médullaires
- Culot 100% pour extraction ADN

Cas n°2

Cas n°2

Cas n°3

- Femme 90 ans
- 41% plasmocytes médullaires
- Culot 100% pour extraction ADN

Cas n°3

Cas n°3

Cas n°4

- Femme 72 ans
- 12.5% plasmocytes médullaires
- Culot 100% pour extraction ADN

Cas n°4

- **Variations de structure :**

- **t(14;16)(q32.33;q23.1)**, correspondant sur le plan moléculaire au réarrangement **IGH::WWOX**

- réarrangements complexes impliquant les chromosomes 3, 8 et 14 composés par :

- t(8;14)(q24.21;q32.33), correspondant sur le plan moléculaire au réarrangement **IGH::MYC**

- t(3;14)(q13.33;q32.33), correspondant à un réarrangement du gène IGH

- t(3;8)(q26.2;q24.21), non récurrente

- fus(3;3)(q13.33;q26.2), non récurrente

Cas n°4

!!!! Contexte de tétraploïdie

Conclusion

- OGM en routine pour le MM
- Détection pangénomique des SVs
- Détection plus précise des partenaires
- IGH::CCND1 à vérifier par FISH
- Parfois réarrangements très complexes
- Problèmes de ploïdie (quid délétion TP53?)

Merci

Equipe de Cytogénétique du CHU de Liège :

Céline Lété

Catherine Menten

Dr. Nicolas Catarin

Alexandra Guadagni

William Llorente

Equipe Bionano :

Lam Nguyen

Guillaume Panara

Dana Jaber

588453 FISH 33 bis : Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception du réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur cellule T), au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une affection lymphoïde chronique (lymphome non-Hodgkinien, leucémie lymphoïde chronique, myélome multiple), à l'exclusion d'une leucémie aiguë, du lymphome de Burkitt, ou des lymphomes lymphoblastiques B ou d'une anémie réfractaire avec excès de blaste (AREB) (Règle diagnostique 1, 6)

587871 OGM 33 bis : Dépistage d'anomalies géniques sub-microscopiques au moyen d'une méthode de biologie moléculaire complexe pangénomique dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie lymphoïde chronique ou d'un myélome multiple #(Maximum 1) (Règle diagnostique 19)